



Surveillance Infirmière des Lambeaux en post-opératoire immédiat dans le cadre des reconstructions carcinologiques des Voies-Aéro-Digestives Supérieures

S. AYED CASENAZ

30 Septembre 2019 – SFORL – Journée Infirmière

Unité de Surveillance Continue – Institut Universitaire de la Face et du Cou - NICE

PLAN

I. LES CHIRURGIES CARCINOLOGIQUES DES VADS

II. LES DIFFERENTS LAMBEAUX

A. LES LAMBEAUX LIBRES

B. LES LAMBEAUX PEDICULES

III. INTERETS DES LAMBEAUX

IV. RISQUES, SURVEILLANCES ET ACTIONS INFIRMIERES EN POST-OP IMMEDIAT

I. LES CHIRURGIES CARCINOLOGIQUES DES VADS


CAVITE BUCCALE	OROPHARYNX	LARYNX ET HYPOPHARYNX
Glossectomie	Oropharyngectomie simple	Cordectomie
Pelvi Glossectomie	Bucco Pharyngectomie Trans Mandibulaire (BPTM)	Laryngectomie Partielle (CHEP ou CHP)
Pelvi Mandibulectomie Interruptrice (PMI)		Laryngectomie Supraglottique
Pelvi Mandibulectomie Non Interruptrice (PMNI)		Pharyngo Laryngectomie Totale ou Circulaire

POPULATION : Patients avec de nombreux facteurs de risques +++ (tabac, alcool, radiothérapie, athéromateux, diabétiques...)

II. LES DIFFERENTS LAMBEAUX

A. LES LAMBEAUX PEDICULES (tissus mous)

→ Lambeaux Locaux / Régionaux



MUSCULAIRES
FASCIO CUTANES
MUSCULO CUTANES


→ **Grand pectoral**

→ **Grand dorsal**

→ Nasogénien

→ Fascia Temporalis

→ Platysma




II. LES DIFFERENTS LAMBEAUX


B. LES LAMBEAUX LIBRES (os, peau, muscle)

→ Lambeaux à Distance

OSSEUX
OSTEO CUTANES
OSTEO MUSCULO CUTANES
→ Fibula (Péroné)



FASCIO CUTANES
MUSCULO CUTANE
→ Anté brachial
(Chinois),
Antérolatéral de
cuisse (Thigh flap,
Vaste externe)



III. INTERETS DES LAMBEAUX

1. Couverture / Protection des vaisseaux
2. Fonctionnalité
3. Esthétique

IV. RISQUES POST-OP IMMEDIAT

1. **Thrombose** des anastomoses
2. **Compression** artério / veineuse
3. Plus tardivement, **Infection** du lambeau

1. PREVENTION DU RISQUE DE THROMBOSE



- ✓ Palette **piquée** par LE CHIRURGIEN 2 à 3X/J la 1^{ère} semaine post op.
- ✓ **Surveiller la Coloration** de la Palette +++
Par l'IDE, surveillance rapprochée +++
toutes les 2h
- ✓ **Anticoagulation** prophylactique sur
Prescription Médicale

2. PREVENTION DU RISQUE DE COMPRESSION ARTERIO - VEINEUSE



- ✓ Surveiller l'Aspect +++
- ✓ Surveillance de l'**hémodynamique**
(Risque **d'hypoperfusion** / Risque **d'hématome**)
- ✓ Surveillance de la **volémie**
- ✓ Pas de **compression** sur les anastomoses

2. PREVENTION DU RISQUE DE COMPRESSION ARTERIO - VEINEUSE

**URGENCE +++
+/- RISQUE DE NECROSE DU LAMBEAU
→ CAT : APPEL CHIRURGIEN EN
URGENCE POUR VERIFICATION DES
ANASTOMOSES**

3. PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX



- ✓ Paramètres Vitaux, Téguments , Agitation, Douleur...
- ✓ **Surveillance locale du lambeau**
- ✓ Prélèvement bactériologique si besoin

CONCLUSION

- ▶ Chirurgies carcinologiques des VADS mutilantes → Lambeaux Nécessaires
- ▶ Risques +++ pour le LAMBEAU LIBRE → Surveillances IDE / Actions IDE
- ▶ COLLABORATION IDE + CHIR → Meilleures chances pour le lambeau.

13

**MERCI
DE
VOTRE
ATTENTION**

