

# Mon enfant a l'oreille qui coule

## URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Pendant ou après un rhume, une rhinopharyngite	Écoulement sale ou verdâtre, ou plus clair Fièvre Douleurs	Oreille décollée Douleurs empêchant le sommeil Écoulement nauséabond Fièvre élevée	Otite moyenne aiguë Mastoïdite si l'oreille est décollée	Médecin traitant ORL Urgences si signes de gravité	Antalgique contre les douleurs ou la fièvre  Ne pas mettre de l'eau dans l'oreille, ou de gouttes
Il a des drains trans-tympaniques ou une perforation connue du tympan	Ecoulement plus ou moins sale Douleurs		Possibilité d'une surinfection sur drain trans-tympanique ou sur perforation tympanique	Médecin traitant ORL pour aspiration sous microscope	Prévention : pas d'eau dans l'oreille en cas de drains trans-tympaniques ou de perforation  Ne pas mettre de l'eau dans l'oreille, ou de gouttes

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Après un bain, ou après un traumatisme au coton tige	Ecoulement plus ou moins sale Douleurs	Douleurs insomniantes Décollement de l'oreille	Possibilité d'une infection du conduit auditif externe (otite externe) ou d'une perforation du tympan	Médecin traitant ORL	Stopper les baignades Prévention : ne jamais nettoyer l'oreille trop profondément Ne pas nettoyer l'oreille soi-même Pas d'eau ni de gouttes sans avis médical
Il est appareillé	Ecoulement avec ou sans douleurs		Possibilité d'une obstruction avec surinfection du conduit auditif externe	ORL	Retirer l'appareil auditif Ne pas mettre d'eau dans l'oreille
Sans raison apparente	Il n'a pas mal à l'oreille Il a l'impression d'oreille bouchée		Possibilité de bouchon de cérumen (L'écoulement est brunâtre) ou de corps étranger	Médecin traitant ORL	Ne pas nettoyer l'oreille en profondeur au coton tige

**Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF**

**Coordonateurs : E. Serrano J-M Juvanon**

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessedé J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.