

Mon enfant a avalé un produit irritant ou brulant

URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Ingestion de Destop® ou équivalent (c'est à dire produit de désobstruction de canalisations, à base de soude) qu'il soit sous forme de granules, de liquide ou de gel Acide (quelle qu'en soit la nature : nitrique, chlorhydrique, sulfurique...) ou tout autre produit irritant	Brûlure intense dans la bouche descendant dans le cou et le thorax Hypersalivation Gêne respiratoire	Pâleur, malaise important, pouls devenant faible Difficultés respiratoires état de choc	Brulure chimique, de la bouche (gene à l'alimentation) de la gorge (difficultés respiratoires en plus) et pouvant aller jusqu'à l'oesophage (signes de choc en plus) Risque mortel en cas d'atteinte de l'oesophage	15 Urgences ALERTE ROUGE si signes de gravité	Apporter le produit ingéré dans son emballage d'origine, ou noter sa présentation (solide, liquide, gel) Noter l'heure de l'ingestion Ne pas faire vomir Ne pas chercher à neutraliser
Ingestion d'Eau de Javel	Brûlure dans la bouche pouvant descendre dans le cou et le thorax	S'il s'agit d'une forme du commerce dans un pays de l'UEE, il ne devrait pas y avoir de signe de gravité car l'Eau de Javel y est vendue diluée Sinon, idem à Destop (ci-dessus)	S'il s'agit d'une forme du commerce dans un pays de l'UEE, il ne devrait pas y avoir de signe de gravité car l'Eau de Javel y est vendue diluée Les brulures seront donc superficielles Sinon, idem à Destop (ci-dessus)	15 Urgences Centre Anti-Poison voir les numéros	Laisser à jeûn Noter l'heure de l'ingestion et la présentation du produit (solide, liquide, gel) Ne pas faire vomir Ne pas chercher à neutraliser
Produit brûlant (aliments...)	En général, brûlures buccales uniquement,	Impossibilité de s'alimenter ou de boire	Brulure superficielle	15 Urgences	Noter l'heure de l'ingestion Attention aux

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
	(rarement dans le cou ou le thorax) avec simple rougeur (brûlure premier degré) Cloques de la muqueuse buccale (brûlures deuxième degré)				biberons chauffés au four à micro-ondes (récipient tiède mais liquide brûlant) Ne pas faire vomir

Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF

Coordonateurs : E. Serrano J-M Juvanon

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessede J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.