

# Mon enfant a reçu un coup sur l'oreille

## URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Après un choc ou une claque sur l'oreille	Douleur, saignement, baisse d'audition	Vertiges Siffllements	Possibilité d'une perforation du tympan	Médecin traitant ORL	Ne pas mettre de l'eau dans l'oreille, ou des gouttes
Le coup a porté sur le pavillon de l'oreille	Douleur Gonflement	Déformation du pavillon Effacement des reliefs	Hématome du pavillon	Médecin traitant ou ORL	Ne pas attendre la résorption Une évacuation chirurgicale peut être nécessaire afin d'éviter une déformation définitive de l'oreille
Le coup a porté sur l'os derrière l'oreille	Douleur Gonflement	Vertige Surdité Ecoulement clair par l'oreille Maux de tête	Fracture du rocher	ORL 15 ou Urgences si signes de gravité	Ne pas mettre de l'eau dans l'oreille, ou des gouttes
Quelque chose est rentré dans son oreille	Douleurs Saignement	Vertiges Siffllements	Possibilité d'une perforation du tympan	ORL 15 ou Urgences si signes de gravité	Ne pas mettre de l'eau dans l'oreille, ou des gouttes