Le rôle infirmier en vidéo-endoscopie interventionnelle

C Molinero, L Buonomano, E Bogdanski,
D Poggio, H Loubet, J Michel, A Mattei, A
Giovanni

Paris, 2021

Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

Un parcours protocolisé

Personnel paramédical formé

2 IDE, 1 AS, 1 Orthophoniste

Un espace dédié

Information sur l'acte

En amont

L'information
préalable

FIBROSCOPIE INTERVENTIONNELLE LARYNGEE

La pathologie que vous présentez nécessite une intervention en fibroscopie interventionnelle laryngée également appelée vidéo-endoscopie interventionnelle (anesthésie locale sur patient éveillé). Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Votre chirurgien est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

N'oubliez pas d'indiquer à votre chirurgien les traitements que vous prenez régulièrement, et en particulier aspirine, anticoagulants... Signalez si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier aux médicaments. Enfin n'oubliez pas d'apporter, lors de l'intervention, les documents médicaux en votre

L'anesthésie locale pourra commencer par une anesthésie des fosses nasales à l'aide d'un spray nasal puis une anesthésie au niveau du larynx sera effectuée. Cette étape entraîne une toux de quelques secondes puis les voies respiratoires sont anesthésiées pendant 30 à 60 minutes. Pendant cette durée, la déglutition et la respiration se poursuivent normalement mais les sensations sont modifiées. Vous devez rester à jeun (ni boire ni manger) durant 1 heure.

Si nécessaire un vasoconstricteur nasal pourra également être utilisé afin de faciliter l'introduction de l'endoscope dans le nez avec un risque d'hypertension artérielle et/ou tachycardie.

L'intervention en elle-même n'est pas douloureuse mais peut entraîner un inconfort surtout lié à un réflexe

Information sur le parcours

IDE en entretien d'accueil

AS faisant un cycle de décontamination

Le matériel d'endoscopie

Fibre laser

Le matériel ancillaire

Aiguille

Brosse cytologique

Pince à biopsie

Le matériel d'urgence à proximité

Lidocaïne : Précautions d'utilisation

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux anesthésiques locaux à liaison amide ou aux sulfites
- Porphyries.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire non encore contrôlés par un pace-maker
- Epilepsie non contrôlée par un traitement
- Insuffisance coronarienne
- Troubles du rythme ventriculaire
- Hypertension artérielle sévère
- Cardiomyopathie obstructive
- Hyperthyroïdie

SIGNES DE SURDOSAGE :

Système nerveux central : nervosité, agitation, bâillements, tremblements, contractions musculaires involontaires, appréhension, nystagmus, logorrhée, céphalées, nausées, bourdonnements d'oreille puis convulsions

Accueil

Préparation

Intervention

Repos

Clôture

Une aide à la relaxation - Pendant

Le matériel à visée pédagogique

Un parcours protocolisé